



Região Edafoclimática de Adaptação (REC)

Características

- Tipo de crescimento: indeterminado
- Altura média de planta: 95 cm
- Peso médio de 1.000 sementes: 171 g
- Acamamento: resistente
- Potencial de ramificação: médio

Reação a doenças

	Suscetível	Mod. Resistente	Resistente
Cancro da haste	[Progressive bar from Suscetível to Resistente]		
Mancha olho-de-rã	[Progressive bar from Suscetível to Mod. Resistente]		
Podridão parda da haste**	[Progressive bar from Suscetível to Mod. Resistente]		
Podridão radicular de Phytophthora*	[Progressive bar from Suscetível to Resistente]		
Pústula bacteriana	[Progressive bar from Suscetível to Mod. Resistente]		
Vírus da necrose da haste	[Progressive bar from Suscetível to Mod. Resistente]		
Nematoide de galha <i>Meloidogyne incognita</i>	[Progressive bar from Suscetível to Mod. Resistente]		
Nematoide de galha <i>Meloidogyne javanica</i>	[Progressive bar from Suscetível to Mod. Resistente]		
Nematoide de cisto	[Progressive bar from Suscetível to Mod. Resistente]		

*Teste para resistência de campo. **Avaliação de campo.

A reação das cultivares às doenças é avaliada conforme descrito nas páginas 10, 11 e 12.

Destaques

- Alta performance com estabilidade nas regiões acima de 500 m, da macrorregião 2;
- Permite semeadura antecipada, encaixando no sistema em sucessão/rotação da 2ª safra; também na Macrorregião 3.

Época de semeadura, População de plantas e Ciclo

Esses atributos de lavoura podem variar em razão do clima, solo e manejo, mas em geral seguem os limites apresentados na tabela abaixo.

Região Edafoclimática de Adaptação (REC)	Altitude (m)	SET			OUT				NOV				DEZ		Ciclo (dias)
		2s	3s	4s	1s	2s	3s	4s	1s	2s	3s	4s	1s	2s	
		Número de plantas finais por metro*													
102	Até 600	14	14	13	13	12	12	12	12	12	13	14			127 a 133
	Acima 600	14	13	13	12	11	11	11	11	11	12	13	13		
103	Até 600	14	13	13	12	11	11	11	11	11	12	13	13		127 a 138
	Acima 600	14	14	13	13	12	12	12	12	12	13	14			
201	Até 600	16	15	14	14	13	13	13	13	13					116 a 137
	Acima 600	15	15	14	13	13	12	12	11	11	11				
201	Até 600				15	14	13	13	13	13	13				116 a 137
	Acima 600	16	15	14	12	12	12	12	12	12					
202	Até 600				16	15	15	15	15	15	15				101 a 121
203	Até 600				16	15	15	15	15	15	15				109 a 119
	Acima 600			16	15	14	14	14	14	14	14				
204	Até 600				16	15	14	14	14	14	14	14			102 a 115
	Acima 600	16	15	14	13	13	13	13	13	13					
301	Até 600			20	20	18	18	18	18	18	18	18	18	20	98 a 104
	Acima 600	20	20	18	18	18	18	17	17	17	17	18	20		
303	Até 600			20	20	18	18	18	18	18	18	18	18	20	109 a 117
	Acima 600	20	20	18	18	18	18	17	17	17	17	18	20		
304	Até 600			20	20	18	18	18	18	18	18	18	18	20	108 a 116
	Acima 600	20	20	18	18	18	18	17	17	17	17	18	20		
401	Até 600				18	18	18	17	17	17	17	18			94 a 100
	Acima 600				17	16	16	16	16	16	17	17			
402	Até 600				20	18	18	16	16	16	17	18			97 a 102
	Acima 600				18	16	16	16	16	16	17	17			

Onde 1s = 1ª semana; 2s = 2ª semana; etc. | * Espaçamento entrelinhas de 45 cm. [Green] Preferencial [Yellow] Tolerada

Exigência em Fertilidade do solo

Baixa

Média

Alta

Na página 13 há explicações sobre fertilidade do solo.