


Região Edafoclimática de Adaptação (REC)



Características

Tipo de crescimento: determinado

Cor da flor: roxa

Cor da pubescência: cinza

Cor do hilo: marrom-claro

Teor médio de proteína: 40,9 %

Teor médio de óleo: 19,5 %

Acamamento: resistente

Altura média de planta: 67 cm a 93 cm

Peso médio de 1.000 sementes: 185 g

Potencial de ramificação: alto

Reação a doenças

A reação das cultivares às doenças é avaliada conforme descrito nas páginas 10, 11 e 12.

Cancro da haste	Resistente
Mancha "olho-de-rã"	Resistente
Podridão parda da haste	Resistente**
Podridão radicular de <i>Phytophthora</i>	Suscetível*
Mosaico comum da soja	Resistente
Vírus da necrose da haste	Suscetível
Nematoide de galha <i>Meloidogyne incognita</i>	Moderadamente resistente
Nematoide de galha <i>Meloidogyne javanica</i>	Suscetível
Nematoide de cisto	Suscetível

*Teste para resistência de campo. Não semear em áreas compactadas e/ou sujeitas ao encharcamento. **Avaliação de campo.

Destaques

- Excelente potencial produtivo, principalmente nas regiões acima de 700 m;
- Excelente potencial produtivo também em áreas com a presença do nematoide de galha *Meloidogyne incognita*;
- Alto teor de proteína.

Época de semeadura, População de plantas e Ciclo

Esses atributos de lavoura podem variar em razão do clima, solo e manejo, mas em geral seguem os limites apresentados na tabela abaixo.

Região Edafoclimática de Adaptação (REC)		Altitude (m)	SET		OUT				NOV				DEZ		Ciclo (dias)
			3s	4s	1s	2s	3s	4s	1s	2s	3s	4s	1s	2s	
			Número de plantas finais por metro*												
102	SC (Oeste e Nordeste); PR (Sudoeste)	Até 600					12	11	11	11	11	12	12		127 a 140
		Acima 600					11	10	10	10	10	11	11		
103	SC (Centro-Norte e Serra Geral); PR (Centro-Sul)	Acima 600					11	10	10	10	10	11	11		130 a 141
		PR (Nordeste); SP (Sul)	Acima 600					12	12	11	11	11	12	12	
201	PR (Oeste e Centro-Oeste)	Até 600					13	13	12	12	12	13			118 a 125
		Acima 600					12	12	11	11	11	12			
	PR (Norte); SP (Médio Paranapanema)	Até 600					14	13	13	13	13	14			
		Acima 600					13	12	11	11	12	12			
202	PR (Nordeste); SP (Sudoeste); MS (Sul)	Até 600					15	14	14	14	14	14		114 a 122	
203	SP (Centro-Sul e Sudoeste)	Até 600					15	14	14	14	14	15		117 a 125	
		Acima 600					14	13	13	13	13	14			
204	MS (Centro-Sul e Sudoeste)	Até 600					13	13	12	12	13	13		116 a 127	
		Acima 600					12	12	11	11	12	12			
301	MS (Centro-Norte); GO (Sudoeste)	Até 600					17	17	16	16	17	17		106 a 110	
		Acima 600					16	16	15	15	16	16			
302	SP (Norte); MG (Vale do Rio Grande); GO (Sul)	Até 600					18	18	17	17	17	17		105 a 108	
		Acima 600					16	16	15	15	16	16			
303	MG (Triângulo e Alto Paranaíba); GO (Sudeste)	Até 600					17	17	16	16	17	17		108 a 113	
		Acima 600					16	16	15	15	16	16			
401	GO (Centro)	Até 600					18	18	18	18	18	18		112 a 115	
		Acima 600					17	17	16	16	17	17			

Onde 1s = 1ª semana; 2s = 2ª semana; etc. | * Espaçamento entrelinhas de 45 cm. ■ Preferencial ■ Tolerada

Exigência em Fertilidade do solo

Baixa

Média

Alta

Fora das épocas preferenciais de semeadura, posicionar a cultivar somente em solos de alta fertilidade. Na página 13 há explicações sobre fertilidade do solo.